

#### CONTRA INDICAÇÕES:

- 1) Perda de peso por razões puramente estéticas
- 2) IMC < 27, exceto no caso de co-morbidades graves
- 3) Distúrbios da motilidade digestiva
- 4) Cirurgia gástrica
- 5) Gestação ou amamentação
- 6) Doenças inflamatórias do trato digestivo alto (úlceras gástricas ou duodenais), neoplasias ou doença de Crohn.
- 7) Doenças com risco de sangramento: varizes esofagogástricas, telangiectasias ou alterações hereditárias (estenoses, atresias, etc.).
- 8) Hérnia de hiato muito volumosa
- 9) Estreitamentos da faringe ou do esôfago
- 10) Condições que contra indiquem a endoscopia
- 11) Distúrbios psiquiátricos
- 12) Etilismo acentuado ou uso de drogas endovenosas
- 13) Recusa em ser acompanhado por programa paralelo de emagrecimento
- 14) Uso de aspirina, AINEs, anticoagulantes ou outros irritantes gástricos

#### RISCO DE COMPLICAÇÕES – na dúvida ligar 9681-1525, 9989-5096 ou 8463-1000 (funcionamento 24 horas)

- 1) Perda de peso insuficiente
- 2) Emagrecimento em obesos acentuados raramente é permanente
- 3) Problemas de saúde decorrentes da perda excessiva de peso
- 4) Desconforto epigástrico, náusea e vômito.
- 5) Dor abdominal ou lombar
- 6) Sensação de peso no abdômen
- 7) Obstrução intestinal, obstrução de esôfago.
- 8) Lesão do trato digestivo alto durante a colocação do balão, com sangramento ou perfuração.
- 9) Crescimento bacteriano no fluido que preenche o balão. Caso haja rotura deste pode ocorrer diarreia, cólicas e febre.
- 10) Ulceração da mucosa gástrica por contato com a superfície do balão
- 11) Esvaziamento do balão