

Receita

Nome do Paciente: _____

Data: ____ / ____ / ____.

1. **Picoprep – compre 01 caixa.**

- Será usado um envelope na tarde anterior do exame e outro no dia do exame, mas veja como usar mais adiante, na parte “**como fazer meu preparo?**”

2. **Simeticona ou Luftal gotas – compre 01 frasco**


- Como as medicações para o preparo do exame podem dar a sensação de gases, esta medicação pode ser usada a qualquer momento caso apresente esta sensação de “gases presos” ou caso apresente alguma distensão abdominal. Neste caso, pode tomar 20 gotas diluída em água até de 6/6 horas.

3. **Domperidona ou Motilium 10mg – compre 01 caixa**

- Esta medicação pode não ser necessária, mas é interessante que esteja disponível durante o preparo e para ser usada caso apresente náuseas (enjoo) ou sensação de vômito durante o preparo.
- Caso tenha esse sintoma, tome 1 comprimido até de 6/6 horas.

4. **Proctyl pomada - 01 frasco**

- Esta medicação também pode não ser necessária, mas deve estar disponível durante o preparo e ser usada caso tenha hemorroidas ou apresente assaduras em decorrência da evacuação frequente, desencadeada pelo preparo. Lembre-se que a higiene da região perianal deve ser feita sempre com água e toalha, evitando o papel higiênico.
- Se for necessário o seu uso, aplique na região perianal até 3x/dia



Dr. Ricardo Alvariz
Diretor Médico da Endoview
CRM 52.49280-8